

平成25年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印

生産者No.	J0037	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	199 a
圃場筆数	17筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	8/5,

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関沢真一



《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	導入先	JA 種子もみ 52 Kg 確認済		
		JA 以外 種子もみ 496 箱 確認済		
	播種月日(月/日)	4/18		
	育苗様式	中苗		
本田管理	田植 時期(月/日)	5/25~5/26		
		植付株数 50 株/坪		
	生育調整 溝切り(月/日)	6/27~6/28		
		中干し(月/日) 6/23~7/9		
		出穂期(月/日) 8/8~8/10		
	倒伏 時期			
		程度 無		
收穫 時期(月/日)	9/18~10/5			
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済		
乾燥・調製	作業形態	組織ライスセンター 委託		
	選別網目	1.90 mm 確認済		
作柄・品質	10a当たり収量	540 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg梱)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	10/02	80	1等	6.0
	10/04	83	1等	5.9
	10/07	46	1等	5.8
計	209		5.9	

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/15	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン粉剤	4/13	7g		床土混和	1	ヒドロキシシソキサゾール
	カスミン粒剤	4/18	20g		覆土混和	0	カスガマイシン塩酸塩(カウントなし)
初期殺菌殺虫	Dr.オリゼスタークル箱粒剤	5/25	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール、ジノテフラン
	ヤイバキ粒剤	5/31		1Kg	散布	2	フェントラザミドピリメスルファン
除草剤							
後期殺菌							
後期殺虫							
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
	くみあい液肥2号		8g	0.16 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
追肥	碓安		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
	魚沼ロマンソルキーパー	5/3		40 Kg	0.00	0.00	2.40	1.60	
土づくり								アルカリ15.0%、H1酸23.0%、苦土4.4%、有機質5%	
	魚沼ロマンパー-SIS220	5/25		28 Kg	3.36	3.22	3.36	2.80	
基肥	なたね油粕	5/4		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
	けい酸加里プレミア34	6/26		30 Kg	0.00	0.00		6.00	
調整肥								けい酸3%、苦土4.4%、有機質0.1%	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/20		9 Kg	0.91	0.57	0.36	1.08	
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/29		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	計					4.52			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.6割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)