


平成25年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関沢 真一

生産者 No.	J0050	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	8 a
圃場筆数	1筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	8/5,

《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済	温湯済	
	導入先	JA 種子もみ		
		JA 以外 種子もみ	20箱	確認済
	播種月(月/日)	4/19		
育苗様式	中苗			
本田管理	田植 時期(月/日)	5/26		
	田植 植付株数	60株/坪		
	生育調整	清切り(月/日)	7/6	
		中干し(月/日)	6/29	
	出穂期(月/日)	8/13		
	倒伏 時期	9月下旬		
	倒伏 程度	少		
收穫 時期(月/日)	10/2			
生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済		
乾燥調整	作業形態	担い手	委託	
	選別網目	1.90mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	500Kg		
	1等米比率	100%		
	月/日	出荷量(30kg箱)	検査等級	玄米タンパク値(%)
		10/04	3	1等
	計	3		5.9

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/15	200倍		24~48時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/19	1000倍		1.0リッター床土灌注	1	ヒドロキシソキサゾール
本田	ヤイバ豆つぶ250	6/1	250g		散布	2	フェントラザミドピリミルファン
	バサグラン液剤	7/19	500ml		散布	1	ペンタゾンナトリウム塩
計						4	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
	べんとう肥		13g	0.26Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
追肥	硝安		5g	0.1Kg	0.03	0.03			
	魚沼ロマンソイルキーパー	5/10		60Kg	0.00	0.00	3.60	2.40	
土づくり	魚沼ロマンソイルキーパー	5/10		60Kg	0.00	0.00	3.60	2.40	
	魚沼ロマンソイルキーパー	5/10		60Kg	0.00	0.00	3.60	2.40	
本田	津南有機121	5/10		38Kg	3.81	2.63	4.56	3.80	
	調整肥								
調整肥	フイフツブ 水田用	6/1		0.2Kg	0.01	0.01		0.02	
	フイフツブ 水田用	7/6		0.3Kg	0.01	0.01		0.03	
	マルチサポート2号	7/6		40Kg	0.00	0.00		付い袋20% 苦土12%	
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/22		10Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機穂肥	8/3		6.4Kg	0.65	0.41	0.26	0.77	
計						3.80			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 3.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)