

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



生産者No.	J0050	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	182 a
圃場筆数	5筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/24, 9/11

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

《 耕種概要 》

区分	内容	附記
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済
	導入先	JA 種子もみ JA 以外 苗
	播種月日(月/日)	4/14
	育苗様式	中苗
本田管理	田植	時期(月/日) 5/23 植付株数 60株/坪
	生育調整	溝切り(月/日) 中干し(月/日)
	出穂期(月/日)	8/5
	倒伏	時期 程度 無
	収穫	時期(月/日) 10/4~10/5
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用
	作業形態	組織タイセンター
	選別網目	1.90mm
	乾燥・調製	10a当たり収量 540Kg 1等米比率 32%
	作柄・品質	月/日
10/08		10 1等 5.6
10/08		102 1等 5.6
計		112 5.6

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	タチガレン液剤	4/14	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシノキサゾール
	カスミン液剤	4/14	4倍		50ml 灌注	0	カスガマイシン-塩酸塩(カウントなし)
初期殺菌殺虫	側条オリゼメトスターク ル顆粒水和剤	5/23		500g	ベスト肥料混和	2	プロベナゾール、ジノテフラン
	ヤイバ豆つぶ250	5/25		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
除草剤							
後期殺菌	MR.ジョーカー粉剤DL	8/12		3Kg	散布	1	シラフルオフェン
後期殺虫							
計						6	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	べんとう肥		15g	0.3 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
追肥									
土づくり	高度ケイサンようりん	5/10		100 Kg	0.00	0.00	20.00		アルカリ45%、けい酸28%、苦土12%
本田	魚沼ロマンベストS220	5/23		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	なたね油粕	5/13		20 Kg	1.00	0.00	0.40	0.20	
調整肥									
種肥	魚沼ロマン有機種肥	7/27		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機種肥	8/3		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計						4.77			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)