


平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



生産者 No.	J0077	品 種 名	コシヒカリBL	栽 培 面 積	43 a
圃 場 筆 数	3 筆	栽 培 協 定	済	圃 場 設 置 及 び 管 理 現 地 確 認 月 日 (月/日)	7/27, 9/13

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済
	導入先	JA 種子もみ JA 以外 苗
	播種月日(月/日)	4/27
	育苗様式	中苗
本田管理	田植	時期(月/日) 5/31 植付株数 50 株/坪
	生育調整	溝切り(月/日) 7/3 中干し(月/日) 7/3
	出穂期(月/日)	8/13
	倒伏	時期 9月下旬 程度 少
	収穫	時期(月/日) 9/28
	生育期間中の畦畔への除草剤使用	未使用
	作業形態	担い手 委託
	選別網目	1.90 mm
	10a当たり収量	480 Kg
	1等米比率	100 %
作柄・品質	月/日	出荷量(30kg個) 検査等級 玄米タンパク値(%)
	10/04	50 1等 5.6
	計	50 5.6

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/21	200倍		24時間浸漬	0	クラロマイセスフラバスク(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/27	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシシンキサゾール
本田	ヤイバ豆つぶ250	6/8		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
	バサグラン粒剤	7/10		3Kg	散布	1	ペンタゾンナトリウム塩
	撒粉ボルドー粉剤DL	7/27		3Kg	散布	0	塩基性硫酸銅
	MRジョーカー粉剤DL	8/22		3Kg	散布	1	シラフルオフェン
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)					
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他	
					全量	内化学合成				
基肥	ホーネンス培土			2700g	54 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号			10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
追肥	魚沼ロマンソイルキーパー	5/18			60 Kg	0.00	0.00	3.60	2.40	アルカリ18.0%、けい酸23.0%、苦土4%、腐植酸3%
	魚沼ロマンベストS220	5/31			30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
基肥	ワールドエースレット	5/18			30 Kg	1.20	0.00	1.50	0.60	
	マルチサポート2号	7/3			40 Kg	0.00	0.00			けい酸20%、苦土12%
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/25			10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機穂肥	8/1			10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計							4.76			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)