

平成25年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成25年11月27日 関沢 真一

生産者No.	J0033	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	258 a
圃場筆数	9筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	8/2

《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	JA 種子もみ	110 Kg 確認済		
	JA 以外 種子もみ			
	播種月日(月/日)	4/15~4/19		
育苗様式	中苗			
本田管理	田植 時期(月/日)	5/18~5/21		
	田植 補付株数	50 株/坪		
	生育調整 溝切り(月/日)	6/20		
	生育調整 中干し(月/日)	6/20		
	出穂期(月/日)	8/10		
	倒伏 時期			
	倒伏 程度	無		
	収穫 時期(月/日)	9/21~9/28		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
	作業形態	自己		
乾燥調整	選別網目	1.90 mm 確認済		
	10a当たり収量	570 Kg		
作柄・品質	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg圓)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/24	108	1等	6.0
	09/25	57	1等	6.0
	09/25	52	1等	5.8
	09/28	109	1等	5.9
計	326		5.9	

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌	4/15					
本田	初期殺菌殺虫剤	5/17	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール・ジノテフラン
	除草剤						
	ヤイバ豆つぶ250	5/27		250g	散布	2	フェントラザミドピリメスルファン
	除草剤	6/28		500ml	散布	1	ペンタゾンナトリウム塩
	後期殺菌						
後期殺虫							
計						5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	基肥 魚沼培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	チッソ以外培土同量肥料使用
	追肥								
土づくり	なたね油粕	5/5		30 Kg	1.50	0.00	0.60	0.30	
	魚沼ロマンベ-ストS220	5/18		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
本田	基肥								
	調整肥								
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/22		15 Kg	1.51	0.95	0.60	1.80	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/26		5 Kg	0.51	0.32	0.20	0.60	
計						4.75			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)